


پروتکل مدیریت درمان بر خورد با بیمار

HTN






پروتکل HTN (BP>140/90)

ویرایش
مرداد ۱۳۹۹

اجرای پروتکل جامع پرخورد با بیمار غیر ترومایی



علائم خطر:

- احساس ناراحتی یا درد در قفسه سینه
- علائم نارسایی حاد قلبی یا ادم ریه
- یافته فوکال عصبی (آفازی و دیس آرتری، سرگیجه، ضعف یکطرفه، بی حسی یکطرفه و سایر یافته های عصبی)
- افت سطح هوشیاری
- علائم دایسکشن آنورت (درد سینه خنجر، اختلاف فشار دو اندام بیش از ۱۰ mmHg)

در صورت وجود علائم استروک: BP < 220/120 نیاز به درمان دارویی ندارد

در سایر موارد خطر، MAP نباید بیشتر از ۲۰٪ کاهش یابد

پروتکل HTN ($BP > 140/90$)

اجرای پروتکل جامع برخورد
با بیمار غیر ترومایی

$BP \geq 220/120$


علایم خطر وجود
دارد؟

$160/90 \leq$
 $BP \leq 220/120$

علایم خطر وجود
دارد؟

$BP \leq 160/90$

علایم خطر وجود
دارد؟



علائم خطر:

احساس ناراحتی یا درد در قفسه سینه

علائم نارسایی حاد قلبی یا ادم ریه

یافته فوکال عصبی (آفازی و دیس آرتری، سرگیجه، ضعف یکطرفه، بی حسی یکطرفه و سایر یافته های عصبی)

افت سطح هوشیاری

علائم دایسکشن آنورت (درد سینه خنجر، اختلاف فشار دو اندام بیش از ۱۰mmHg)

در صورت وجود علائم استروک: $BP < 220/120$ نیاز به درمان دارویی ندارد

در سایر موارد خطر، MAP نباید بیشتر از ۲۰٪ کاهش یابد