

# پروتکل مدیریت درمان برخورد با بیمار آنافیلاکتیک





# پروتکل واکنش آنافیلاکتیک

ویرایش

مرداد 1399

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

- IV Line >
- نرمال سالین >
- اکسیژن درمانی با غلظت بالا >
- مانیتورینگ قلبی >
- مدیریت راه هوایی >

خفیف

1 شدید

- 3 کلرفنیرامین: 10mg IM و در کودکان: 0/1mg/kg IM
- سایمتیدین: 200mg IV Slow و در کودکان: 10mg/kg
- دیفن هیدرامین: 50mg و در کودکان: 1mg/kg

ترمال سالین برای حفظ فشار خون سیستولیک بیشتر از 90

مانیتورینگ از نظر تشدید علائم

خیر

- 2 اپی نفرین: 0/5 – 0/3 mg IM و کودکان: 0/01 mg/kg IM حداکثر 0/3mg
- کلرفنیرامین: 10mg IM و در کودکان: 0/1mg/kg IM حداکثر 10mg
- هیدروکورتیزون: 200mg IV و در کودکان: 5-10mg/kg
- H2 بلاکر
- دیفن هیدرامین: 50mg و در کودکان: 1mg/kg حداکثر 50mg

بله

ترمال سالین با دوز 20cc/kg در اطفال یا 1Lit در بالغین (قابل تکرار)

انتقال فوری به مرکز درمانی / پایش مداوم

- 1 علائم شدید شامل: اختلال هوشیاری، علائم تهدیدکننده راه هوایی (شامل ویز، تورم گلو و زبان، احساس جسم خارجی در گلو، خشونت و گرفتگی صدا و ...) علائم درگیری سیستم قلبی عروقی (تاکی کاردی، نبض ضعیف، کاهش BP) درگیری شدید سیستم تنفسی (تنگی نفس) و کپیر منتشر
- 2 در صورت درگیری دو ارگان آنافیلاکسی مطرح می شود.
- 3 تزریق وریدی اپی نفرین ممنوع می باشد.
- 3 کلرفنیرامین در کودکان زیر 2 سال ممنوع است.

# پروتکل واکنش آنافیلاکتیک

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

- IV Line ➤
- نرمال سالین ➤
- اکسیژن درمانی با غلظت بالا ➤
- مانیتورینگ قلبی ➤
- مدیریت راه هوایی ➤

خفیف

شدید

خفیف

شدید

کلرفنیرامین 10mg IM : و در کودکان: 0/1mg/kg IM  
H2 بلاکر  
دیفن هیدرامین : 50mg و در کودکان: 1mg/kg

- اپی نفرین: 0/3 – 0/5 mg IM و کودکان: 0/01 mg/kg IM حداکثر 0/3mg
- کلرفنیرامین 10mg IM و در کودکان 0/1mg/kg IM حداکثر 10mg
- هیدروکورتیزون 200mg IV و در کودکان: 5-10mg/kg
- H2 بلاکر
- دیفن هیدرامین : 50mg و در کودکان: 1mg/kg حداکثر 50mg

نرمال سالیन برای حفظ فشار خون سیستولیک بیشتر از ۹۰

مانیتورینگ از نظر تشدید علائم

نرمال سالین با دوز 20cc/kg در اطفال یا یک تا دو لیتر در بالغین (قابل تکرار)

خیر

بله

انتقال فوری به مرکز درمانی / پایش مداوم

- ✓ ۱ علائم شدید شامل: اختلال هوشیاری، علائم تهدیدکننده راه هوایی (شامل ویز، تورم گلو و زبان، احساس جسم خارجی در گلو، خشونت و گرفتگی صدا و ...) علایم درگیری سیستم قلبی عروقی (تاکی کاردی، نبض ضعیف، کاهش BP) درگیری شدید سیستم تنفسی (تنگی نفس) و کهیر منتشر
- ✓ در صورت درگیری دو ارگان آنافیلاکسی مطرح می شود.
- ✓ ۲ تزریق وریدی اپی نفرین ممنوع می باشد.
- ✓ ۳ کلرفنیرامین در کودکان زیر ۲ سال ممنوع است.