

پروتکل مدیریت درمان بر خورد با بیمار مسموم شده با ارگانوفسفره ها





ویرایش
مرداد ۱۳۹۹

پروتکل مسمومیت با ارگانوفسفره (DUMBBELLS)

اجرای پروتکل جامع بر خورد با بیمار غیر ترومایی

****توجه:** رعایت PPE با استفاده از دستکش، گان و پوشش کامل کارکنان عملیاتی و اگر سم مایع و در سطح پوست باشد، پاکسازی پوست و خارج سازی لباس بیمار

۱ هر یک از علائم /BBB
خیر
بله
۲ DUMBBELLS را دارد؟

۳ آتروپین 1-3mg IV یا 6mg IM تکرار
هر ۵ دقیقه تا کنترل علائم BBB

انتقال و اطلاع به مرکز درمانی مناسب / پایش مداوم جهت بروز مجدد علائم BBB
آمادگی برای احیا

• در صورت اکسیژن درمانی استفاده از نازل کاتولا و در صورت O2sat کمتر از ۹۵٪ استفاده از روش های با غلظت بالاتر
• در بیماران مسموم از خوردن شیر و ... و همچنین تحریک استفراغ خودداری گردد.
• در صورت شک به هر نوع مسمومیت، مانیتورینگ قلبی لازم است
• در صورت تشنج، درمان با بنزودیازپین ها شروع و در صورت عدم پاسخ و نیاز به داروی دوم، از تجویز فنی توئین خودداری شود. (مراجعه به پروتکل تشنج)

۳ هدف از کنترل علائم: بهبود علائم BBB و خشک شدن ترشحات ریوی تا پاک شدن صداهای ریوی (از بین رفتن رال، ویز و روتکای)

۱ **DUMBBELLS:**
Diarrhea: اسهال
Urrination: پرادراری
Miosis: میوز
BBB: برونکواسپاسم
۲ برونکوره، برادیکاردی
Emesis و استفراغ
Lacrimation اشک ریزش
Lethargic: خواب آلودگی
Salivation افزایش بزاق

۱ پروتکل مسمومیت با ارگانوفسفره (DUMBBELLS)

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

****توجه:** رعایت PPE با استفاده از دستکش، گان و پوشش کامل کارکنان عملیاتی و اگر سم مایع و در سطح پوست باشد، پاکسازی پوست و خارج سازی لباس بیمار

۲ هر یک از علائم BBB /DUMBBELLS را دارد؟

۳ آتروپین 1-3mg IV یا 6mg IM تکرار هر ۵ دقیقه تا کنترل علائم BBB

انتقال و اطلاع به مرکز درمانی مناسب / پایش مداوم جهت بروز مجدد علائم BBB
آمادگی برای احیا

- در صورت اکسیژن درمانی استفاده از نازال کانولا و در صورت O2sat کمتر از ۹۵٪ استفاده از روش های با غلظت بالاتر
- در بیماران مسموم از خوردن شیر و ... و همچنین تحریک استفراغ خودداری گردد.
- در صورت شک به هر نوع مسمومیت، مانیتورینگ قلبی لازم است
- در صورت تشنج، درمان با بنزودیازپین ها شروع و در صورت عدم پاسخ و نیاز به داروی دوم، از تجویز فنی توئین خودداری شود. (مراجعه به پروتکل تشنج)

۳
هدف از کنترل علائم: بهبود
علائم BBB و خشک شدن
ترشحات ریوی تا پاک شدن
صداهای ریوی (از بین رفتن رال،
ویز و رونکای)

DUMBELLS:

Diarrhea: اسهال

Urination: پرادراری ۱

Miosis: میوز

BBB: برونکواسپاسم برونکوره، برادیکاردی

Emesis: تهوع و استفراغ

Lacrimation اشک ریزش ۲

Lethargic: خواب آلودگی

Salivation افزایش بزاق