

# پروتکل مدیریت درمان برخورد با بیمار مبتلا به درد شکم





## پروتکل مدیریت درد شکم

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

بله  
اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار ترومایی

شرح حالی از تروما وجود دارد؟

خیر

علائم شوک/علائم حیاتی ناپایدار

بله

خیر

NPO  
مانیتورینگ مداوم قلبی  
اکسیژن درمانی با غلظت بالا  
IVLine (ترجیحاً سبز یا خاکستری)  
مایع درمانی سرم نرمال سالین ۱ تا ۲ لیتر (در اطفال 20cc/kg)  
تله کاردیومیسیسین

NPO  
تله کاردیومیسیسین (در صورت وجود درد بالای ناف)  
IVLine  
سرم نرمال سالین KVO  
در صورت تهوع و استفراغ اندانسترون 4mg و

توسیه به  
مراجعه سریایی  
به مرکز یا ذکر  
علائم هشدار

مشاوره ۵۰-۱۰۰:  
• تعیین نیاز به کنترل دارویی درد  
• تعیین نیاز به اعزام:  
• نیاز به اعزام دارد؟

بله

اجرای پروتکل انتقال بیماران غیر ترومایی

- معاینه شکم به ترتیب شامل: مشاهده، سمع، لمس و دق
- در صورت وجود  $BS > 250$  شک به کتواسیدوز دیابتی: مراجعه به پروتکل مربوطه
- علائم شوک شامل:

تقسیم بندی شوک همورازیک				
شاخص	کلاس ۱	کلاس ۲	کلاس ۳	کلاس ۴
مقدار خون از دست رفته CC	<750	750-1000	1000-1500	>2000
در صد خون از دست رفته	<15%	15-30%	30-40%	>40%
نبض	<100	100-120	120-140	>140
فشارخون	نرمال	نرمال	کاهش	کاهش
فشار نبض	نرمال افزایش	کاهش	کاهش	کاهش
تنفس	14-20	20-30	30-40	>25
وضعیت ذهنی	کمی مضطرب	مضطرب	مضطرب/گیج	گیج/کما تویز

# پروتکل مدیریت درد شکم

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

شرح حالی از تروما  
وجود دارد؟

بله

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار ترومایی

خیر

علائم  
شوک/علائم  
حیاتی ناپایدار

بله

خیر

- NPO
- مانیتورینگ مداوم قلبی
- اکسیژن درمانی با غلظت بالا
- IV Line (ترجیحاً سبز یا خاکستری)
- مایع درمانی سرم نرمال سالین ۱ تا ۲ لیتر (در اطفال 20cc/kg)
- تله کاردیومدیسین

اجرای پروتکل انتقال بیماران غیر ترومایی

- NPO
- تله کاردیومدیسین (در صورت وجود درد بالای ناف)
- IV Line
- سرم نرمال سالین KVO
- در صورت تهوع و استفراغ اندانسترون 4mg و در اطفال 0/15mg/kg
- آهسته وریدی

مشاوره ۵۰-۱۰:

تعیین نیاز به کنترل دارویی درد  
تعیین نیاز به اعزام:  
نیاز به اعزام دارد؟

خیر

توسیه به مراجعه سرپایی به مرکز با ذکر علائم هشدار

بله

اجرای پروتکل انتقال بیماران غیر ترومایی

- معاینه شکم به ترتیب شامل: مشاهده، سمع، لمس و دق
- در صورت وجود  $BS > 250$  شک به کتواسیدوز دیابتی: مراجعه به پروتکل مربوطه
- علائم شوک شامل:

تقسیم بندی شوک هموراژیک				
شاخص	کلاس ۱	کلاس ۲	کلاس ۳	کلاس ۴
مقدار خون از دست رفته <b>CC</b>	$< 750$	۷۵۰-۱۰۰	۱۵۰۰-۲۰۰۰	$> 2000$
در صد خون از دست رفته	$< 15\%$	۱۵-۳۰٪	۳۰-۴۰٪	$> 40\%$
نبض	$< 100$	۱۰۰-۱۲۰	۱۲۰-۱۴۰	$> 140$
فشارخون	نرمال	نرمال	کاهش	کاهش
فشار نبض	نرمال/افزایش	کاهش	کاهش	کاهش
تنفس	۱۴-۲۰	۲۰-۳۰	۳۰-۴۰	$> 35$
وضعیت ذهنی	کمی مضطرب	مضطرب	مضطرب/گیج	گیج/ کماتوز