

پروتکل مدیریت درمان برخورد با بیمار مضطرب و بی قرار





اضطراب و بی قراری

ویرایش

مرداد ۱۳۹۹



هیپوگلیسمی:

- بزرگسالان:
BS<70mg/dl
- اطفال:
BS<50 mg/dl

یا

هیپرگلیسمی:

- BS>250mg/dl

توجه به علائم به ویژه:

- سکنه مغزی
- هایپوکسی
- فشارخون بالا
- مسمومیت
- تشنج در فاز Postictal
- سندرم هایپروتیلیاسیون

۲

اضطراب و بی قراری

امنیت لازم برای ورود به صحنه وجود دارد؟

خیر

اطلاع به دیسپچ جهت تماس با پلیس
پیش بینی نحوه ورود نیروهای کمکی
عدم ورود تنهایی به صحنه

بله


علائم به دنبال تروما
شروع شده است؟

خیر

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار ترومایی

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار غیر ترومایی

بله



توجه به علائم به ویژه:

- مسمومیت
- تشنج در فاز Postictal
- سندرم هایپرونتیلیاسیون
- سکتة مغزی
- هایپوکسی
- فشارخون بالا

هیپوگلیسمی:

بزرگسالان: $BS < 70 \text{ mg/dl}$

اطفال: $BS < 50 \text{ mg/dl}$

یا

هیپرگلیسمی:

$BS > 250 \text{ mg/dl}$ ➤