

پروتکل مدیریت درمان بر خورد با بیمار بی حال






ضعف و بی حالی


ویرایش


مرداد 1399



- | | | | |
|---|--|---|---|
| <p>4 توجه به علائم به ویژه:</p> <ul style="list-style-type: none"> نارسایی قلبی مسمومیت شوک Postictal مشکلات ریوی اختلال الکترولیت | <p>3 علائم FAST+</p> <ul style="list-style-type: none"> کج شدن صورت ضعف یک طرفه اندام اختلال تکلم زمان کمتر از 4/5 ساعت | <ul style="list-style-type: none"> درد فشارنده قفسه سینه درد انتشاری به فک پایین، کتف و دست چپ تعریق تنگی نفس احساس ضعف و گیجی درد هنگام فعالیت | <p>1 هیپوگلیسمی:</p> <ul style="list-style-type: none"> بزرگسالان: BS < 70mg/dl اطفال: BS < 50 mg/dl <p>یا</p> <p>هیپرگلیسمی:</p> <ul style="list-style-type: none"> BS > 250mg/dl |
|---|--|---|---|

ضعف و بی حالی





۱

هیپوگلیسمی:

بزرگسالان: $BS < 70 \text{mg/dl}$

اطفال: $BS < 50 \text{mg/dl}$

یا

هیپرگلیسمی:

$BS > 250 \text{mg/dl}$ ➤

۲

➤ درد فشارنده قفسه سینه

➤ درد انتشاری به فک پایین، کتف و

دست چپ

➤ تعریق

➤ تنگی نفس

➤ احساس ضعف و گیجی

➤ درد هنگام فعالیت

۳

علائم FAST+

➤ کج شدن صورت

➤ ضعف یک طرفه اندام

➤ اختلال تکلم

➤ زمان کمتر از 4/5 ساعت

۴

توجه به علائم به ویژه:

نارسایی قلبی

مسمومیت

شوک

Postictal

مشکلات ریوی

اختلال الکترولیت