

# پروتکل مدیریت درمان برخورد با بیمار ترومای فک و صورت





# پروتکل ترومای فک و صورت

ویرایش

مرداد ۱۳۹۹

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار ترومایی

نوع آسیب

چشم

جدا سازی لنز های تماسی  
(در صورت نیاز و امکان)

در سوختگی شیمیایی، با  
ترمال سالین یا آب  
شرب حداقل ۳۰ دقیقه  
با فشار ملایم بشویید و  
در صورت امکان نوع  
ماده را تشخیص دهید

اگر جسم خارجی باعث  
ترومای نفوذی شده بود  
از جابجایی آن جلوگیری  
کنید

هر دو چشم را با شیلد  
چشمی بپوشانید و  
تثبیت کنید

زبان و بافت نرم دهان

باز نگه داشتن راه هوایی و در  
صورت نیاز ساکشن ترشحات

کنترل خونریزی با فشار  
مستقیم با گاز  
(توجه داشته باشید که باعث  
انسداد راه هوایی نشود)

بینی

باز نگه داشتن راه هوایی و در  
صورت نیاز ساکشن ترشحات  
دهانی

بیمار را به صورت نشسته و رو  
به جلو قرار دهید(در صورت  
امکان) ، ترمه بینی را فشار  
دهید و کمپرس سرد روی پل  
بینی را در نظر بگیرید

••مراقب سرمازدگی بینی  
باشید

گوش

بررسی از نظر جسم  
خارجی

کنترل خونریزی با فشار  
مستقیم / پانسمان  
فشاری

دندان

در صورت کنده شدن  
دندان بلافاصله آن را  
در کیت حفاظت  
دندان یا در شیر  
(در صورت وجود) و یا  
در گاز استریل  
مرطوب قرار دهید

••از لمس کردن  
ریشه خودداری کنید

••از شستشوی دندان  
خودداری کنید. فقط  
الودگی های واضح به  
دقت برداشته شوند.

پایش مداوم، تماس با مرکز و انتقال به مرکز درمانی مناسب و مشاوره پزشکی

# پروتکل ترومای فک و صورت

اجرای پروتکل جامع برخورد با بیمار ترومایی

## نوع آسیب

### چشم

جدا سازی لنز های تماسی (در صورت نیاز و امکان)

در سوختگی شیمیایی، با نرمال سالین یا آب شرب حداقل ۲۰ دقیقه با فشار ملایم بشویید و در صورت امکان نوع ماده را تشخیص دهید

اگر جسم خارجی باعث ترومای نفوذی شده بود از جابجایی آن جلوگیری کنید

هر دو چشم را با شیلد چشمی بپوشانید و تثبیت کنید

### زبان و بافت نرم دهان

باز نگه داشتن راه هوایی و در صورت نیاز

کنترل خونریزی با فشار مستقیم با گاز (توجه داشته باشید که باعث انسداد

راه هوایی نشود)

### بینی

باز نگه داشتن راه هوایی و در صورت نیاز

بیمار را به صورت نشسته و رو به جلو قرار دهید (در صورت امکان) ، نرمه بینی را فشار دهید و کمپرس سرد روی پل بینی را در نظر بگیرید

\*\*مراقب

### گوش

بررسی از نظر جسم

کنترل خونریزی با فشار مستقیم / پانسمان

فشاری

### دندان

در صورت کنده شدن دندان بلافاصله آن را در کیت حفاظت دندان یا در شیر (در صورت وجود) و یا در گاز استریل مرطوب قرار دهید

\*\*از لمس کردن ریشه خودداری کنید

\*از شستشوی دندان خودداری کنید. فقط آلودگی های واضح به دقت برداشته شوند.

پایش مداوم ، تماس با مرکز و انتقال به مرکز درمانی

# نوع آسیب

## چشم

جدا سازی لنز های تماسی (در صورت نیاز و امکان)

در سوختگی شیمیایی، با نرمال سالین یا آب شرب حداقل ۲۰ دقیقه با فشار ملایم بشویید و در صورت امکان نوع ماده را تشخیص دهید

اگر جسم خارجی باعث ترومای نفوذی شده بود از جابجایی آن جلوگیری کنید

هر دو چشم را با شیلد چشمی بپوشانید و تثبیت کنید

## زبان و بافت نرم دهان

باز نگه داشتن راه هوایی و در صورت نیاز ساکشن ترشحات دهانی

بیمار را به صورت نشسته و رو به جلو قرار دهید (در صورت امکان) ، نرمه بینی را فشار دهید و کمپرس سرد روی پل بینی را در نظر بگیرید  
\*\*مراقب سرمازدگی بینی باشید

## گوش

## دندان

در صورت کنده شدن دندان بلافاصله آن را در کیت حفاظت دندان یا در شیر (در صورت وجود) و یا در گاز استریل مرطوب قرار دهید

\*\*از لمس کردن ریشه خودداری کنید

\*از شستشوی دندان خودداری کنید. فقط آلودگی های واضح به دقت برداشته شوند.

پایش مداوم ، تماس با مرکز و انتقال به مرکز درمانی مناسب و مشاوره پزشکی

# نوع آسیب

چشم

زبان و بافت  
نرم دهان

بینی

گوش

دندان

باز نگه داشتن راه  
هوایی و در صورت نیاز  
ساکشن ترشحات

بررسی از نظر جسم  
خارجی

کنترل خونریزی با  
فشار مستقیم /  
پانسمان فشاری

کنترل خونریزی با فشار  
مستقیم با گاز  
(توجه داشته باشید که باعث  
انسداد راه هوایی نشود)

پایش مداوم ، تماس با مرکز و انتقال به مرکز درمانی مناسب و مشاوره پزشکی